

1 タンパク値表示の基準値を「水分換算表示(乾燥水分15%)」から「乾基準表示(乾燥水分0%)」へ選択することができるようになりました!

● 営農支援システムと食味収量コンバインでは、タンパク値表示に「水分換算表示」を標準採用しておりますが、市場要望により「乾基準表示」を選択することが可能になりました。

水分換算 (乾燥水分 15%)

乾燥水分 **15%**とした時のタンパク含有率



(クボタ標準採用)

乾基準 (乾燥水分 0%)

乾燥水分 **0%**とした時のタンパク含有率



タンパク値表示の差

水分換算 (15%)	乾基準
6.8%	8.0%
6.4%	7.5%
6.0%	7.0%
5.5%	6.5%
5.1%	6.0%

乾基準では水分換算と比較して、約1% タンパク値が高く表示されます

※開発中の為、掲載の画面は予告なく変更されることがあります。


標準採用の「水分換算」から「乾基準」への基準値変更方法(2パターン)

パターン1 作付計画の基準値設定から「乾基準」に変更できます。

※基準値の「変更」をクリック

※タンパク含有率の表示設定を「乾基準」に変更

パターン2 同様に「食味・収量の分布図」画面の基準値設定から「乾基準」に変更できます。



※基準値の「変更」をクリック

※タンパク含有率の表示設定を「乾基準」に変更

※開発中の為、掲載の画面は予告なく変更されることがあります。

2 水分含有率・タンパク含有率の補正值が調整可能になりました！

- 特殊な品種(低アミロース米・もち米・新品種米)の**水分含有率・タンパク含有率**が実際の値と比べ傾向的に差がある場合、補正值をお客様自身で調整することが可能になりました。

作付計画の基準値設定画面

基準値		変更	
食味・収量分布図 ランクA設定	推定収量(kg/10a)	10aあたり	540 kg
	タンパク含有率(%)	5.5% ~	6.5%
刈取り時の計算 パラメータ	目標仕上水分率(%)	15%	
	整粒率(%)	75%	
	水分補正值(%)	0%	
	タンパク補正值(%)	0%	
タンパク含有率	表示設定	水分換算(15.0%)	

※基準値の「変更」をクリック

キャンセル 保存

基準値の設定

食味・収量分布図 ランクA設定	推定収量(kg/10a)	10aあたり	540	kg以上
	タンパク含有率(%)	5.5	% ~	6.5
刈取り時の計算 パラメータ	目標仕上水分率(%)	15		
	整粒率(%)	75		
	水分補正值(%)	-0.5	%	- +
	タンパク補正值(%)	0.2	%	- +
タンパク含有率	表示設定	水分換算(15.0%)	記憶値	

- ※**水分含有率** : -5% ~ 5% の範囲で、0.5 単位に調整値を設定可能
- ※**タンパク含有率** : -3% ~ 3% の範囲で、0.2 単位に調整値を設定可能
- ※刈取り時の計算パラメータは、刈取り前に事前に設定しておく必要があります

※開発中の為、掲載の画面は予告なく変更されることがあります。